



Grandes
Cultures

vertissements[®] agricoles uvergne

Bulletin technique N° 4 du 14/04/94

COLZA
Sclerotinia : Risques importants.

BLE

Maladies: Attendre.

ORGE D'HIVER

Maladies : Agir rapidement

POIS

Sitones : A surveiller.

BETTERAVES - TOURNESOL

Limaces : A surveiller.

LE LABOVERT A VOTRE SERVICE...

La période actuelle de froid et de forte humidité perturbe fortement l'ensemble des cultures.

COLZA

Stades (Début floraison - F1.
à
(Début formation des siliques - G2.

MALADIES

★ Situation

- SCLEROTINIA : Les risques sont importants. Les apothécies sont bien visibles
- PSEUDOCERCOSPORELLA: Peu d'évolution..
- PHOMA SUR COLLET : Des dégâts sont observés localement (verse).

★ Préconisation

Intervenir d'urgence contre le Sclérotinia.

Choisir un fongicide adapté.

Surveiller la durée de floraison, en effet un renouvellement pouvant se justifier (15 à 20 jours d'intervalle).

Ne pas ajouter d'insecticide à la bouillie.

Publication mensuelle
Abonnement annuel : 230 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

P110

BLE

Stades (stagnation) (Redressement (5) - 1 noeud (6)
(2 noeuds (7) très localement.

MALADIES

★ Situation

Très peu d'évolution depuis le dernier bulletin.

Confirmation d'un risque globalement faible pour le piétin-verse.

Sur le feuillage :

- septoriose : très fréquente à la base
- oïdium : légère progression

★ Préconisation

Globalement, il est conseillé d'attendre.

A partir du stade 2 noeuds (7), une surveillance de la septoriose notamment s'impose.

ORGE D'HIVER

Stade : 1 noeud (6)

MALADIES

Rappel d'une intervention dès le stade (6) visant l'ensemble des maladies du feuillage : Rhynchosporiose, Helminthosporiose, Rouille naine et Oïdium.

POIS

SITONES

★ Situation

Des attaques localement fortes sont notées.

★ Préconisation

A surveiller de près jusqu'au stade 10 cm de hauteur. Intervenir rapidement dès l'observation de morsures sur l'ensemble des premières feuilles.

BETTERAVES - TOURNESOL

LIMACES

★ Situation

Les risques sont importants dès la levée.

★ Préconisation

Visiter vos parcelles très souvent quelques jours après le semis.

Intervenir rapidement si nécessaire avec une spécialité homologuée comme :

SKIPPER - MESUROL, MALICE et spécialités à base de métaldéhyde.

IMPORTANT : Epandre les granulés de façon homogène (pas de tas) pour éviter tout problème avec le gibier.

LE LABOVERT A VOTRE SERVICE ...

Le "LABOVERT" : Véhicule équipé en un véritable Laboratoire permet de réaliser des diagnostics sur le terrain.

Il rend déjà de grands services chez nos Collègues de la région CENTRE.

Le S.R.P.V. AUVERGNE et la F.R.A.D.E.C vous offrent les services et les compétences de cet outil au cours de 4 demi-journées.

Vous pouvez apporter vos échantillons pour diagnostic aux lieux de rendez-vous suivants :

1 - 27 Avril 1994 : 14 h - 17 h à FRANCHESSE (03) -Place de la Mairie.

2 - 28 Avril 1994 : 9 h 30 à 12 h à DOMPIERRE-/BESBRE (03)
Parking Antenne Chambre Agriculture.

3 - 28 Avril 1994 : 14 h 30 - 17 h à GANNAT (03)
Parking Ancien C.F.P.P.A. - Antenne Chambre Agriculture.

4 - 29 Avril 1994 : 9 h 30 à 12 h à SAINT-ANDRE-LE-COQ (63)
Parking du Centre de Loisirs.

F111